



## Viral Hepatitler

# Telaprevir Tedavisi Alan Bir Kronik Hepatit C Hastasında Anemi Yönetimi

**Tuba İLGAR<sup>1</sup>, Cemal BULUT<sup>1</sup>, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU<sup>1</sup>, Sami KINIKLI<sup>1</sup>, Ali Pekcan DEMİRÖZ<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

### Soru(n)

Telaprevir tedavisi alan bir kronik hepatit C hastasında anemi yönetimi.

### Olay/Olgu

Elli yedi yaşında erkek hasta, nüks kronik hepatit C tanısıyla telaprevir 3 x 750 mg tablet, peg-interferon alfa-2b 100 mcg/hafta ve ribavirin sabah 400 mg, akşam 600 mg tedavileri başlandı. Tedavi başlangıcında hastanın hemoglobini 14.8 g/dL idi. Tedavinin 4. haftasında hastanın hemoglobini 12.5 g/dL'ye düştü.

### Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın hemoglobininin daha da düşme eğiliminde olduğu öngörülerek hastanın ribavirin tedavisinin dozu sabah 400 mg, akşam 400 mg'a azaltıldı, hemoglobin düşmeye devam ettiği için ribavirin dozu haftalık kontrollerle 200 mg azaltıldı. Tedavi 12. haftasında hemoglobini 8.9 g/dL'ye kadar gerileyince ribavirin tedavisi kesildi. Tedavi 12 hafta tamamlandığından telaprevir tedavisi de kesildi. Hastanın hemoglobini 14. haftada tekrar 10.2 g/dL'ye yükseldi ve hastaya ribavirin yeniden başlanarak dozu kademeli olarak yükseltildi. Hastanın 24. haftada tedavisi tamamladı. Takiplerinde HCV-RNA negatif seyretti.

### Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Telaprevir tedavisi alan hastalarda hemoglobin düşmeye başlayınca daha düşük değerleri görmeden ribavirin dozu da azaltılmaya başlanmalı mı? Ribavirin dozunu azaltmanın ve kesmenin yanıt etkisi var mı?