Viral Hepatitler

P-010

Pegile İnterferon, Ribavirin, Telaprevir Tedavisi Alırken İkinci Kez Amnezi Gelişen Bir Olgu

Gülbin CANPOLAT[1], Cemal BULUT[1], Sami KINIKLI[1], Ali Pekcan DEMİRÖZ[1]

[1] *Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara*

Soru(n)

Pegile interferon, ribavirin, telaprevir tedavisi başlanan kronik hepatit C'li hastada amnezi bulguların gelişmesi.

Olay/Olgu

Elli bir yaşında erkek hastaya iki yıl önce kronik hepatit C tanısı konmuş ve interferon-ribavirin tedavisi başlanmış. Tedavi başlandıktan kısa süre sonra hastada unutkanlık şikayetleri başlamış. O dönemdeki psikiyatrik muayenesinde psikomotor fonksiyonlarda yavaşlama tespit edilmiş. Yapılan nörolojik muayenesi ve görüntüleme yöntemleriyle bir patoloji saptanmamış. Hastanın unutkanlık şikayetlerinde artış olmamış ve 48. haftada tedavisi kesildikten sonra şikayetleri tamamen gerilemiş. Tedavi kesilmesinden bir yıl sonra HCV-RNA'sı pozitifleşen hastaya psikiyatrik muayenesi ve tüm tetkikleri tamamlandıktan ve bir sorun olmadığı görüldükten sonra pegile interferon, ribavirin ve telaprevir tedavisi başlandı. Hasta henüz hastanedeyken yine unutkanlıktan yakınmaya başladı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Psikiyatri hekimiyle tekrar iletişime geçildi. Hastanın muayenesinde tedavi gerektirmeyen hafif amnezi tariflediği ve kognitif fonksiyonlarının normal olduğu belirtildi. Hastaya ve yakınlarına kullanılan antivirallerin yan etkileri konusunda bilgi verildi ve şikayetlerinde artış olursa hemen hastaneye başvurmaları anlatılarak ve bir sonraki kontrolünde psikiyatri ve nörolojik muayeneleri tekrarlanmak üzere taburcu edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

İnterferonun tedavisi sırasında ateş yüksekliği, halsizlik, sitopeni , tiroid fonksiyon bozukluğu ve cinsel fonksiyon bozukluğu gibi yan etkilerle karşılaşılabilir. Bunların dışında daha az sıklıkta psikiyatrik yan etkileri de görülebilir. Psikiyatrik yan etkiler depresyon ve anksiyete bozukluğu ve daha az olarak demans ve demans benzeri yan etkilerdir. Literatürde interferonun demans yaptığına dair yayınlar mevcuttur. Bu yan etkiler interferonun nörotoksik etkilerine bağlanmıştır ve bazı yayınlarda tedavi sonlandırıldıktan sonra tamamen geri dönüşümlü amnezi bulgularından bahsedilirken bazılarında progresif ve geri dönüşümsüz demans söz konusudur. Bizim bu hastalarla ilgili başlıca iki sorunumuz vardır. Birincisi; kronik hepatit C'li hastalar yaşlanıyor ve bu hastalar için yeni bir umut olan üçlü tedavinin yan etkilerini yaşlı hastalarda yönetmek çok daha zor. İnterferonun nöropsikiyatrik yan etkilerini tedavi alan hastalarda iyi ayırt edebilmek için tedavi öncesi muayeneleri çok önem taşımaktadır. Demansif ya da psikiyatrik bulgular varlığında bu bulguların antiviral tedavi sırasında kötüleşebileceği unutulmamalıdır. İkinci problem ise; interferon tedavisi sırasında amnezi şikayetler geliştiğinde tedaviyi keselim veya ara verelim mi? Biz bu olguda, bir önceki interferon, ribavirin tedavisi sırasında gelişen amnezisinin, tedavi sonlandığında düzelmesi nedeniyle interferon tedavisine devam ettik. Ancak yeni başlayan bu şikayetler ilerlerse kesmeli miyiz?