



## Viral Hepatitler

**Kronik Hepatit B Tedavisi İçin Hasta Seçimi**

**Süheyla KÖMÜR<sup>1</sup>, Ferit KUŞCU<sup>2</sup>, Aslıhan CANDEVİR ULU<sup>1</sup>, Behice KURTARAN<sup>1</sup>, A. Seza İNAL<sup>1</sup>, Yeşim TAŞOVA<sup>1</sup>, Hasan Salih Zeki AKSU<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana

<sup>2</sup> Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana

**Soru(n)**

Fibrozisi yüksek düşük viral yükü olan hastaların tedavisi.

**Olay/Olgü**

Kronik hepatit B nedeniyle uzun süredir izlenen ve ailede kronik hepatit B'ye bağlı hepatoselüler karsinom öyküsü olan 23 ve 52 yaşında erkek hasta polikliniğimize başvurdu. Yirmi üç yaşında olan erkek hastaya askerlikte karaciğer biyopsisi yapılmış ve fibrozisi 4, histolojik aktivite indeksi 11 olarak saptanmış. Hastanın üçer ay arayla bakılan HBV-DNA değerleri ise 298, 196 ve 1465 IU/mL, ALT: 51 olarak bulunmuş. Elli iki yaşında olan hastanın merkezimizde yapılan karaciğer biyopsisinde fibrozis 2, histolojik aktivite indeksi 11 olarak saptanmış. Her iki hasta da HBV-DNA 2000 IU/mL'nin altında olduğu için sağlık uygulama tebliğine göre tedavi kapsamı dışındadır.

**Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?**

Endikasyon dışı ilaç kullanımı için başvuruldu, ancak herhangi bir gerekçe gösterilmeden reddedildi.

**Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu**

İleri fibrozis, düşük HBV-DNA'ya sahip olan hastaların tedavisi.