



HIV/AIDS

Temas Sonrası HIV Profilaksisi

E. Ediz TÛTÛNCÛ¹, Yunus GÛRBÛZ¹

¹ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

HIV pozitif hastanın kanıyla bulaşmış kesici-delici alet ile yaralanan sağlık çalışanında temas sonrası profilaksi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Olay/Olgu

Hastanemiz dahiliye servisinde çalışan bir hemşire, bayram tatilindeki nöbetinde serviste yatan bir hastadan kan aldıktan sonra yanlışlıkla iğneyi kendi eline batırdığını söyledi. İğnenin üzerinde gözle görünür kan lekesi varmış. Hastanın HIV pozitif olduğunu olaydan 6 gün sonra öğrenmişler.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Temas sonrası profilaksi için önerilen süre geçmiş olmasına rağmen, hemşireye antiretroviral profilaksi başlama kararı verildi. Ancak ilaçlar hastane eczanesinde bulunmadığı için dışarıdan temin edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

HIV teması olan sağlık çalışanlarında mümkün olan en kısa süre içinde ve en fazla 72 saat içinde profilaksi başlanması önerilmektedir. Bu olayda önerilen süre geçmiş olmasına rağmen antiretroviral ilaç başlamanın bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır. Ancak benzer çoğu durumda bu yaklaşım uygulanmaktadır. Ayrıca, önerilen kısıtlı sürede antiretroviral ilaç temininde de sorun yaşanmaktadır. Profilaksi gereken sağlık personelinde risk değerlendirmesi ve izlem nasıl planlanmalıdır? Bu konunun tartışılması istenmektedir.