

P-078

## Ameliyatta Sterilizasyon Şüphesi Olan Malzeme Kullanılması Sonrası Tutum Ne Olmalıdır?

**Acar AREN<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

### Soru(n)

Ameliyatta sterilizasyon şüphesi olan malzeme kullanılması.

### Olay/Olgu

Rutin bir meme kanseri ameliyatı sonrası, ameliyat sorumlu hemşiresi ameliyatta steril olduğu şüpheli bir bohça açıldığı geri bildirimini yaptı.

### Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastada tetanoz profilaksisi dahil tüm önlemler alındı. Tedavi dozunda geniş spektrumlu antibiyotik kullanıldı. Yakın gözlenen hasta sorunsuz olarak taburcu edildi. Kullanılan bohçanın bir önceki ameliyatta açılan ancak kullanılmayan bohça olduğu anlaşıldı.

### Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Zaman zaman ameliyathanede sterilizasyonu şüpheli malzemelerle karşılaşırız. Bu malzemeler her zaman nonsteril kabul edilmelidirler. Bu konu zaten genel kabul gören bir durum olup asıl önemli olanı yanlışlıkla kullanıldığında geri bildirimini yapılmasıdır. Hasta güvenliği açısından çok önemli olan bu durumda birçok dış merkezde ödüllendirme sistemi getirilmiştir. Ülkemizde ise geri bildirimden dolayı ceza alacağı korkusuyla bundan kaçınılmakta ve kötü sonuçlarla yüzleşilmektedir. Olayımızda da geri bildirim yapan hemşireye bu tip davranışları tekrarlamaması konusunda uyarılsa da tüm arkadaşları önünde yaptığı bu davranış nedeniyle teşekkür edilmiştir.