Diğer

P-137

Frontal Sinüzit Sonrası Gelişen Tromboz Olgusu

Mutlu UYSAL YAZICI[1], Şanlıay ŞAHİN[1], Ganime AYAR[1], Bahar ÇUHACI ÇAKIR[1], Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY[2], Hasan TEZER[3]

[1] Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara
[2] Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İnfeksiyon Ünitesi, Ankara
[3] Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara

Soru(n)

Menenjit bulgularıyla gelen hastada infeksiyon zemininde gelişen tromboz olasılığı akılda tutulmalıdır.

Olay/Olgu

Daha öncesinden sağlıklı olan 4 yaşında erkek çocukta 4 gün önce burun akıntısı ve öksürük şikayeti başlamış. Aile hekimi tarafından tonsillit düşünerek oral amoksisilin tedavisi başlanmış. Tedavinin ikinci gününde baş ağrısı ve kusma şikayeti beliren hasta acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde belirgin meningeal irritasyon bulguları olan hastada menenjit düşünüldü. Göz dibinde papil ödemi nedeniyle yapılan kraniyazal görüntülemede; oksipitalde belirgin olmak üzere bilateral sagital sinüs trombozu saptandı. Hastaya çekilen paranazal sinüs tomografisinde frontal sinüzit bulundu. Hastaya düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisi başlandı. Tromboz etyolojisi açısından tromboz tetkikleri gönderildi. Hastada frontal sinüzit zemininde gelişen tromboz düşünüldü. Tedavi sonrasında hasta genel durumu iyi ve bilinci açık olarak yoğun bakımda izlenmektedir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Menenjit zemininde sagital sinüs trombozu gelişen hastaya acil tromboz tedavisi başlandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Hastanın tüm fizik muayenesinin detaylı olarak yapılması gerekmektedir. Tonsillit ve sinüzit gibi üst solunum yolu infeksiyonlarında tedaviye rağmen klinik durumda bozulma gelişen ve baş ağrısı ve kusma gibi yeni semptom geliştiren hastalarda menenjit ve sagital sinüs trombozu gibi komplikasyonlar akılda tutulmalıdır.