

P-139

Diğer

Fasiyolazis Hastalarında Triklabendazol Temin Edil(e)memesi?

**Mehmet Reşat CEYLAN¹, Ali İrfan BARAN¹, Fatih ESMER¹, Mehmet ÇELİK¹,
Mustafa Kasım KARAHOCAGİL¹**

¹ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Soru(n)

Fasiyolazis tanısı konulan hastalarda tedavi amaçlı triklabendazol kullanılması gerekmektedir. Bu etken maddeyi içeren ticari insan preparatları ülkemizde bulunmamakta ve ilaç yurt dışından temin edilebilmektedir.

Olay/Olgu

Otuz dört yaşında kadın hasta yaklaşık üç ay önce başlayan halsizlik, karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetleri ile başvurdu. Hastanın son bir aydır artan karın ağrısı şikayeti özellikle sağ üst karın bölgesinde oluyormuş. Fizik muayenede sağ üst kadranda palpasyonla hassasiyet dışında başka bir bulguya rastlanmadı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın laboratuvarında; ALT: 25 IU/L, AST: 30 IU/L, Hgb: 13 mg/dL, WBC: 16.900/mm³, %30 eozinofili ve Total IgE: 60 IU/L idi. Bilgisayarlı tomografi (BT): “Karaciğer normal büyüklükte, konturları düzenli, parankimi homojen, segment altında yaklaşık 6 x 3 cm ebatlı birbiri ile bağlantılı olma eğiliminde sınırları düzensiz hipodens lezyon alanları dikkati çekmektedir, görünüm parazitoz ile uyumludur” şeklinde rapor edildi. Hastanın bakılan fasciola hepatica İHA testi pozitif olarak geldi. Klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulgularıyla hastaya fasiyolazis tanısı konuldu. Hastaya triklabendazol (Egaten®, Novartis Pharma, Switzerland) satın alması için reçete edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Hasta yaklaşık bir hafta sonra elinde etken maddesi triklabendazol olan bir kutu ilaç ile başvurdu. İlacın yurt dışından (İran) temin edildiği ve hayvan preparatı olduğu görüldü. Hastaya bu ilacın hayvanlarda kullanıldığı, bu ilacı kullanamayacağı ve bizim önerdiğimiz (Egaten) ilacı alması gerektiği söylendi. Hasta: “ Maddi durumunun iyi olmadığını, bu ilacı temin edemediğini, akrabalarında da benzer hastalığın görüldüğünü, başka hekimlere gittiği ve bu ilacın kullanıldığı, hastaların iyileştiğini söyledi.” Hastaya önerilen ilaç eczaneler aracılığıyla bir hafta sonra temin edildi. Triklabendazol 10 mg/kg tek doz başlandı, 24 saat sonra doz tekrarlandı. Bir ay sonra yapılan kontrolde BT bulguları gerilemiş ve hastanın şikayetleri kalmamıştı.

Egaten ticari preparatı ülkemizde bulunmamakta ve yurt dışından temin edilmektedir. Bölgemizde Fasiyolazis hayvanlarda endemik görülmekte ve insanlarda bazen salgınlar şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Hastalar çoğunlukla alım gücü zayıf olan, hijyen koşullarının zayıf olduğu kırsal kesimlerden gelmektedir.

Egaten ticari preparatı ülkemiz de SGK tarafından ödenebilir mi?

İnsan preparatı temin edilemeyen yerlerde hayvan preparatı kullanılabilir mi?

Bu konuların tartışılması istenmektedir.