

Diğer

P-169

Osteomiyelit

Tarık IRMAK¹, Yahya GÜVENÇ¹, Nuran SARI¹, Özlem KÖSEOĞLU¹¹ Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara**Soru(n)**

Romatoid artrit ve osteomiyelit birlikteliğinde ne yapalım?

Olay/Olgü

Lomber disk hernisi operasyonu sonrası vertebral osteomiyelit gelişen aktif romatoid artritli hastaya teikoplanin + imipenem başlandı. Tedavinin 7. gününde hastanın sedimentasyon ve CRP düzeylerinde yarı yarıya azalma oldu. Sonrasında hasta romatolojiye konsülte edilerek romatid artrit için metotreksat + salazopirin + prednizolon başlandı. Bu tedavinin eklenmesinden 5 gün sonra hastanın sedimentasyon ve CRP düzeyleri tekrar eski seviyesine yükseldi. Bunun üzerine eklenen tedavinin hastanın immün sistemini baskılayarak enfeksiyonu aktive ettiği düşünülerek hastanın romatoid artrit tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar kesildi, yalnızca teikoplanin ve imipenem tedavisine devam edilerek izlenmeye başlandı. Tedavinin 4-6 hafta sürdürülmesi planlandı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

1. Yükleme dozu ile teikoplanin + imipenem başlandı.
2. Tedavisine romatoid artrit teavisi için metotreksat + salazopirin + prednizolon (10 mg) eklendi.
3. Enfeksiyonun alevlenmesi üzerine romatoid artrit tedavisi kesildi. Yalnızca teikoplanin + imipenem tedavisine devam ediliyor.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

İmmünsüpresif tedavi alan hastalarda enfeksiyon geliştiğinde immünsüpresif tedavinin kesilmesi ve enfeksiyon tedavisi tamamlandıktan sonra immünsüpresif tedaviye devam edilmesi önerilmekte.

Osteomiyelit ve benzer diğer kronik enfeksiyonların romatoid artrit ve buna benzer diğer otoimmün hastalıklarla birlikteliğini nasıl tedavi edelim? Nasıl izleyelim? Osteomiyelitin tedavi süresi ne kadar olsun?