



Viral Hepatitler

İlk Kez Tedavi Alacak Kronik Hepatit C Olgusunda Direkt Etkili Antiviral Kullanma İsteği

Sibel ALTUNIŞIK TOPLU¹

¹ Malatya Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Malatya

Soru(n)

Naiv hastada direkt etkili antiviral ajan kullanılamaması.

Olay/Olgu

Kırk yaşında kadın hasta, halsizlik şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Babası kronik hepatit C nedeni ile pegile interferon ve ribavirin tedavisi kullanmıştı. Anti-HCV pozitif saptanan hastanın HCV RNA'sı 1.256.317 kopya/mL saptandı. Genotip 1 olarak rapor edildi. Hastanın babasının tedavi sürecinin uzunluğu ve deneyimleri nedeni ile tedavi süresinin daha kısa sürede olması istendi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastaya pegile interferon, ribavirin ve direkt etkili antiviral ajanlardan telaprevir başlanması düşünüldü. Daha önce tedavi almamış olması nedeni ile telaprevir verilebilmesi için endikasyon dışı ilaç kullanım formu düzenlendi. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmede ilaç onaylanmadı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Kronik hepatit C tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler kaydedildi. Özellikle pegile interferon, ribavirin ve direkt antiviral etkili ilaçlarla üçlü tedavi sonucu genotip 1 hastalarında kalıcı viral yanıtın daha yüksek oranlara ulaştığı bildiriliyor. Aynı zamanda tedavi süresi kısalabiliyor. Ancak daha zor, komplike yan etkilerin arttığı hasta yönetiminin zorlaştığı kronik hepatit C tedavisi olduğunu biliyoruz. Naiv hastada üçlü tedavi seçeneğinin karşılanamıyor olmasını, belki de komplikasyonların daha az görülebilecek bu hasta grubunda çözümlenmesi gerek bir durum diye düşünmekteyiz.