



HIV/AIDS

Benim HIV'im Bende Saklı; Çocuğuma Miras Onurum Kalsın

Ahmet Çağkan İNKAYA¹, Şehnaz ALP¹, Aygen TÜMER², Serhat ÜNAL¹

¹ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

² Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi, Ankara

Soru(n)

Yirmi haftalık gebe elinde HIV doğrulama sonucuyla polikliniğimize başvurdu.

Olay/Olgu

Yirmi yedi yaşında daha önceden bilinen bir hastalığı olmayan Nevbahar rumuzlu hasta kliniğimize başvurdu. Nevbahar'ın yapılan tarama testinde HIV pozitif olduğunun saptanması üzerine kliniğimize refere edildiği öğrenildi. Eşi, Nesim'in de yapılan tetkiklerinde HIV pozitif olduğu anlaşılmıştı. Panik halinde polikliniğimize başvurdular.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Öncelikle çifte HIV enfeksiyonu hakkında profesyonel danışmanlık hizmeti verildi. İnfeksiyonun doğal seyri, hamilelerde tedavi yöntemleri, HIV pozitif gebenin takibi hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Nevbahar ve Nesim'in soruları cevaplandırıldı. Uluslararası kılavuzlarda önerilen başlangıç testleri yapılarak TDF/FTC + LPV/r başlandı. Gebeliğin 36. haftasında sectio planlandı. Gebeliğin 30. haftasında bakılan HIV RNA halen daha 5000 kopya/mL olduğu için, LPV/r dozu 3 x 400/100 mg olacak şekilde artırıldı. Gebeliğin 36. haftasında HIV RNA 150 kopya/mL olduğu halde membran rüptürü sebebiyle, rüptürün 4. saatinde sectio'ya alındı. IV zidovudin altında operasyona verilen hastanın bebeğine doğum sonrası ART başlandı. Doğumun 6. ayında bebek HIV RNA (-), anti HIV (+) (ELISA) olarak takip edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Gebelerde HIV taraması gerekli mi?

Gebelere ART verilebilir mi? Güvenilir mi?

ART'ye ne zaman başlayalım?

LPV/r dozu gebelikte ne olmalı?

Doğum eylemi sırasında neler yapılmalı?

Doğum sonrası bebeğin takibi nasıl olmalı?

Erken ART ile HIV ile infekte yenidoğanda viral eradikasyon sağlanabilir mi?